

Black Hairy Tongue (lưỡi lông đen)

Nguồn: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1800351>

Người dịch: BS. Trần Thị Khánh Quỳnh – Khoa Y – Trường ĐH Duy Tân



Một phụ nữ 55 tuổi đã được đưa vào bệnh viện sau với tiền sử có chấn thương nghiêm trọng đè bẹp cả hai chân trong một tai nạn xe. Một nhiễm trùng vết thương đa vi khuẩn phát triển và cô đã được điều trị bằng thuốc meropenem (tiêm tĩnh mạch) và minocycline (đường uống). Sự đổi màu đen ở lưỡi của cô đã được quan sát thấy trong vòng 1 tuần sau khi bắt đầu điều trị (hình A) và bệnh nhân báo cáo buồn nôn và có mùi hôi trong miệng. Người ta nghi ngờ tình trạng lưỡi lông đen là do điều trị bằng minocycline (đường uống). Lưỡi lông màu đen là một tình trạng lành tính đặc trưng bởi phì đại và kéo dài của nhú dạng chỉ trên bề mặt của lưỡi, với sự đổi màu nâu đen. Tình trạng này có thể liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm vệ sinh răng miệng kém, sử dụng thuốc lá hoặc bị kích thích từ nước súc miệng hoặc thành phần của kháng sinh, đặc biệt là tetracycline. Lưỡi lông màu đen thường khởi và không có di chứng lâu dài miễn là chất gây tủa không còn xuất hiện và bệnh nhân thực hành vệ sinh răng miệng tốt. Ở bệnh nhân này, người ta ngưng minocycline (đường uống) và sử dụng một phác đồ kháng sinh thay thế. Cô được khuyên nên thực hành vệ sinh răng miệng tốt. Trong vòng 4 tuần sau khi ngừng minocycline (đường uống), lưỡi của cô trở lại màu bình thường (hình B).