

SỐT DO VẾT CẢN (African Tick – Bite Fever)

Nguồn: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1810093>

Người dịch: BS. Trần Châu Mỹ Thanh – Khoa Y – Trường Đại Học Duy Tân



Cả hai anh em 10 và 12 tuổi đến khoa cấp cứu với tiền sử sốt 2 ngày và đau đầu vào ngày sau khi trở về từ chuyến đi đến Nam Phi, Mozambique và Zambia. Họ không nhớ có bất kỳ vết cắn nào. Qua thăm khám, người anh trai có một vết loét trên bắp chân (Bảng A), và người em trai có một vết loét sau tai (Bảng B) và trên lông mày. Cả hai anh em đều không nhạy cảm đau, phát ban dát sần ở cổ tay, chân và thân, cũng như bệnh hạch bạch huyết vùng gần với vết loét. Xét nghiệm cấy máu tìm kí sinh trùng là âm tính. Dùng clavulanate Amoxicillin cho các vết nhiễm trùng do muỗi đốt. Tuy nhiên, việc tìm thấy nhiều vết loét và thực tế là hai thành viên trong gia đình bị mắc đã cho thấy nghi ngờ về bệnh sốt do ve cắn ở châu Phi. Sốt do vết cắn này ở châu Phi gây ra bởi Rickettsia Châu Phi và lây truyền qua ve của giống Amblyomma. Điều trị bằng Doxycycline đã được cho vào theo kinh nghiệm và cơn sốt đã được xử trí ở cả hai trẻ trong vòng 24 giờ. Doxycycline đã được dùng trong 7 ngày và vết loét đã được giải quyết trong vòng 2 tuần sau khi điều trị. Các xét nghiệm huyết thanh cho rickettsia, ban đầu âm tính, đã dương tính ở cả hai bệnh nhân sau theo dõi 3 tháng.