

Khe hở dưới niêm mạc

Submucosal Cleft Palate

Nguồn:

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1913924?query=featured_secondary

Người dịch: BS. Trần Châu Mỹ Thanh – Khoa Y – Trường Đại học Duy Tân



Một người đàn ông 25 tuổi đến phòng khám tai mũi họng với giọng nói âm thanh đi qua khoang mũi (giọng mũi) và trào ngược thức ăn vào khoang mũi có từ thời thơ ấu. Ông không có tiền sử nhiễm trùng tai tái phát hoặc chậm phát triển hoặc chậm phát triển ngôn ngữ. Khám thực thể cho thấy tật lưỡi gà chẻ đôi và một khiếm khuyết dưới niêm mạc dọc theo đường giữa của khẩu cái cứng với một khe hở dưới niêm mạc. Nội soi mũi họng cho chức năng vùng vòm mềm-hầu không có khả năng để phân ra khoang mũi và khoang miệng bằng sự cử động của khẩu cái và hầu. Không có dấu hiệu sờ nắn khẩu cái cứng phía sau, và không có bất thường sọ não nào khác. Sút môi dưới niêm mạc thường được gây ra bởi sự kết hợp không hoàn chỉnh của khẩu cái với vách ngăn mũi ở mức độ của khẩu cái cứng và sự gắn kết bất thường của lớp cơ ở khẩu cái mềm với cạnh sau của khẩu cái cứng. Bệnh nhân đã từ chối điều trị phẫu thuật và đã được chuyển sang trị liệu ngôn ngữ.